

Hermite-Interpolation

- Gegeben sind Stützstellen $x_0, x_1, \dots, x_m$ sowie Funktionswerte $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_m)$ und Werte der Ableitungen $f', \dots, f^{(\mu_i)}$ in den Stützstellen, wobei $\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{N}$ verschieden sein können.

Stützstellen	x_0	x_1	$\dots$	x_m
Funktionswerte	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\dots$	$f(x_m)$
Funktionswerte	$f'(x_0)$	$f'(x_1)$	$\dots$	$f'(x_m)$
der Ableitungen	$f''(x_0)$	$f''(x_1)$	$\dots$	$f''(x_m)$
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	$f^{(\mu_0)}(x_0)$	$f^{(\mu_1)}(x_1)$	$\dots$	$f^{(\mu_m)}(x_m)$

(1)

Beispiel für $m = 3$, $\mu_0 = 3$, $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 1$ und $\mu_3 = 2$:

x_i	0	1	2	3
$f(x_i)$	2	-1	0	2
$f'(x_i)$	4	-	1	4
$f''(x_i)$	8	-	-	8
$f'''(x_i)$	12	-	-	-

- Gesucht ist ein Polynom $p \in \mathbb{P}_n$ vom Grad $n := -1 + \sum_{j=0}^m (\mu_j + 1)$ zu den $n + 1 = \sum_{j=0}^m (\mu_j + 1)$ Interpolationsvorgaben. Das Polynom p heißt auch Hermite-Interpolationspolynom.

- Satz: Zu jeder Hermite-Interpolationsvorgabe gemäß (1) gibt es genau ein Interpolationspolynom $p \in \mathbb{P}_n$.

- Berechnungsverfahren 1: Es gilt

$$p(x) = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^{\mu_j} f^{(k)}(x_j) \omega_j^k(x) \quad (2)$$

mit Polynomen $\omega_j^k \in \mathbb{P}_n$, die durch die $n + 1$ Interpolationsbedingungen

$$\frac{d^l}{dx^l} \omega_j^k(x_i) = \delta_{lk} \delta_{ij}, \quad 0 \leq l, k \leq \mu_j, \quad 0 \leq i, j \leq m \quad (3)$$

festgelegt sind. Die Polynome ω_j^k werden wie folgt definiert:

$$\Omega_j(x) := \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^m (x - x_k)^{\mu_k + 1}, \quad (4)$$

$$\alpha_j := \frac{d^{\mu_j}}{dx^{\mu_j}} \left[\Omega_j(x) (x - x_k)^{\mu_j} \right] \Big|_{x=x_j} = \mu_j! \cdot \Omega_j(x_j), \quad (5)$$

$$\omega_j^{\mu_j}(x) := \frac{1}{\alpha_j} \cdot \Omega_j(x) \cdot (x - x_j)^{\mu_j}, \quad (6)$$

$$\omega_j^k(x) := c_{jk} \cdot \Omega_j(x) \cdot (x - x_j)^k - \sum_{i=k+1}^{\mu_j} b_{ik}^{(j)} \omega_j^i(x), \quad k = \mu_j - 1, \dots, 1, 0, \quad (7)$$

mit

$$c_{jk} := \left(\frac{d^k}{dx^k} [\Omega_j(x) (x - x_j)^k] \Big|_{x=x_j} \right)^{-1} = \frac{1}{k! \cdot \Omega_j(x_j)} \quad (8)$$

und

$$b_{ik}^{(j)} := \frac{d^i}{dx^i} \left(c_{jk} \cdot \Omega_j(x) (x - x_j)^k \right) \Big|_{x=x_j}, \quad i = k + 1, \dots, \mu_j \quad (9)$$

- Berechnungsverfahren 2 (Darstellung nach Newton):

Für $f \in C^n[a, b]$ und für Punkte $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ ist der $(k-i)$ -te verallgemeinerte Differenzenquotient wie folgt definiert: Für $x_i \neq x_k$ (mit $i < k$) ist

$$\Delta_t^{k-i}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_k)f(t) := \frac{1}{x_k - x_i} \left[\Delta_t^{k-i-1}(x_{i+1}, \dots, x_k)f(t) - \Delta_t^{k-i-1}(x_i, \dots, x_{k-1})f(t) \right] \quad (10)$$

und es gilt

$$\Delta_t^{k-i}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_k)f(t) = \Delta_s^1(x_i, x_k) \Delta_t^{k-i-1}(s, x_{i+1}, \dots, x_{k-1})f(t). \quad (11)$$

Für den Fall $x_i = x_{i+1} = \dots = x_k$ (mit $i < k$) ist

$$\Delta_t^{k-i}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_k)f(t) := \frac{f^{(k-i)}(x_i)}{(k-i)!}. \quad (12)$$

Setze

$$(z_0, z_1, \dots, z_n) := \left(\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{(\mu_0+1)\text{-mal}}, \underbrace{x_1, \dots, x_1}_{(\mu_1+1)\text{-mal}}, \dots, \underbrace{x_m, \dots, x_m}_{(\mu_m+1)\text{-mal}} \right) \quad (13)$$

Dann gilt (mit $m_i := \mu_i + 1$, $i = 0, 1, \dots, m$)

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^n \prod_{j=0}^{i-1} (x - z_j) \cdot \Delta_t^i(z_0, \dots, z_i)f(t) \\ &= \Delta_t^0(z_0)f(t) + \sum_{i=1}^n \prod_{j=0}^{i-1} (x - z_j) \cdot \Delta_t^i(z_0, \dots, z_i)f(t) \\ &= \sum_{i=0}^m \prod_{l=0}^{i-1} (x - x_l)^{m_l} \cdot \left\{ \sum_{j=0}^{\mu_i} (x - x_i)^j \cdot \Delta_t^{m_0+\dots+m_{i-1}+j} \left(\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{(\mu_0+1)\text{-mal}}, \dots, \underbrace{x_{i-1}, \dots, x_{i-1}}_{(\mu_{i-1}+1)\text{-mal}}, \underbrace{x_i, \dots, x_i}_{(j+1)\text{-mal}} \right) f(t) \right\} \quad (14) \end{aligned}$$