

Remes-Algorithmus

- **Problem:** Bestimme die beste polynomiale Approximation aus $\mathbb{P}_n$ an die Funktion $f \in C(X)$ bezüglich der Maximumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ auf X , wobei $X \subset [a, b] \subset \mathbb{R}$, $|X| \geq n+2$ und X kompakt.
- **Initialisierung:** Wähle eine Startreferenz $X^{(0)} = \{x_0^{(0)}, x_1^{(0)}, \dots, x_{n+1}^{(0)}\} \subset X$ mit $x_0^{(0)} < x_1^{(0)} < \dots < x_{n+1}^{(0)}$ und setze $i := 0$.
- **Verfahrensschritt:** Löse das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0^{(i)} & \dots & (x_0^{(i)})^n & 1 \\ 1 & x_1^{(i)} & \dots & (x_1^{(i)})^n & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n^{(i)} & \dots & (x_n^{(i)})^n & (-1)^n \\ 1 & x_{n+1}^{(i)} & \dots & (x_{n+1}^{(i)})^n & (-1)^{n+1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0^{(i)} \\ a_1^{(i)} \\ \vdots \\ a_n^{(i)} \\ \sigma^{(i)} \varrho^{(i)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0^{(i)}) \\ f(x_1^{(i)}) \\ \vdots \\ f(x_n^{(i)}) \\ f(x_{n+1}^{(i)}) \end{pmatrix}$$

für die unbekannten Koeffizienten $a_0^{(i)}, a_1^{(i)}, \dots, a_n^{(i)}$ der besten Approximierenden

$$p_i(x) = \sum_{j=0}^n a_j^{(i)} x^j$$

aus $\mathbb{P}_n$ auf $X^{(i)}$ mit dem Fehler $\varrho^{(i)} \geq 0$ und $\sigma^{(i)} \in \{-1, 1\}$. Bestimme ein $x^{(i)} \in X$ mit

$$|(f - p_i)(x^{(i)})| = \|f - p_i\|_\infty.$$

Falls $|(f - p_i)(x^{(i)})| = \varrho^{(i)}$ gilt, ist $\hat{p} := p_i$ beste Approximierende an f auf $X \rightarrow$ Stopp!

Sonst bestimme $X^{(i+1)}$, indem in $X^{(i)}$ ein Punkt durch $x^{(i)}$ wie folgt ersetzt wird:

- **Fall 1:** Es gilt $x^{(i)} < x_0^{(i)}$. Falls $\text{sign}[(f - p_i)(x^{(i)})] = \text{sign}[(f - p_i)(x_0^{(i)})]$, ersetze $x_0^{(i)}$ durch $x^{(i)}$. Sonst ersetze $x_{n+1}^{(i)}$ durch $x^{(i)}$.
- **Fall 2:** Es gilt $x_j^{(i)} < x^{(i)} < x_{j+1}^{(i)}$ für ein $j \in \{0, 1, \dots, n\}$. Falls $\text{sign}[(f - p_i)(x^{(i)})] = \text{sign}[(f - p_i)(x_j^{(i)})]$, ersetze $x_j^{(i)}$ durch $x^{(i)}$. Sonst ersetze $x_{j+1}^{(i)}$ durch $x^{(i)}$.
- **Fall 3:** Es gilt $x_{n+1}^{(i)} < x^{(i)}$. Falls $\text{sign}[(f - p_i)(x^{(i)})] = \text{sign}[(f - p_i)(x_{n+1}^{(i)})]$, ersetze $x_{n+1}^{(i)}$ durch $x^{(i)}$. Sonst ersetze $x_0^{(i)}$ durch $x^{(i)}$.

Ordne die Elemente von $X^{(i+1)}$ der Größe nach (durch Umnummerierung). Dann gilt $x_j^{(i+1)} < x_{j+1}^{(i+1)}$ und $\text{sign}[(f - p_i)(x_j^{(i+1)})] = -\text{sign}[(f - p_i)(x_{j+1}^{(i+1)})]$ für alle $j = 0, 1, \dots, n$. Ersetze i durch $i+1$ und führe einen weiteren Verfahrensschritt durch.

- **Behauptung:** Falls das Verfahren nicht schon nach endlich vielen Schritten endet, dann ist

$$\hat{p}(x) := \sum_{j=0}^n \left(\lim_{i \rightarrow \infty} a_j^{(i)} \right) \cdot x^j$$

beste Approximierende an f auf X .

- **Bemerkungen:**

- Das Verfahren wird stark beschleunigt, wenn mehrere Punkte aus $X^{(i)}$ gleichzeitig verschoben bzw. ausgetauscht werden.
- Die Folge der Referenzen $X^{(i)}$ muss nicht notwendig konvergieren, da die Alternante einer besten Approximation nicht eindeutig bestimmt sein muss.