

Interpolation und Approximation

für die Studiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Physik im Sommersemester 2013

Geben Sie Ihren Namen und Matr.-Nr. auf Ihrer Lösung an und heften Sie alle Blätter zusammen!

Übungsblatt 2 - Abgabe bis Dienstag, 30.04.2013, 12:00 Uhr im Postfach 32 im HG

Aufgabe 2.1 (8 Punkte)

- (a) Zeigen Sie mit Hilfe des Hornerchemas, dass das Polynom $f(x) = 4x^5 - 6x^4 - 13x^3 + 3x^2 - x - 159$ an der Stelle $x = 3$ verschwindet, und spalten Sie den Linearfaktor dieser Nullstelle vom Polynom ab, indem Sie die Koeffizienten des Polynoms g mit $f(x) = (x - 3) \cdot g(x)$ im Hornerchema ablesen.
- (b) Werten Sie mit Hilfe des Hornerchemas das Polynom $f(x) = 3x^6 + 3x^4 + 5x^3 - 2x - 7$ an der Stelle $x = 3$ aus. Stellen Sie f in der Form $f(x) = (x - 3) \cdot g(x) + f(3)$ dar.

Aufgabe 2.2 (5 Punkte)

Entwickeln Sie das Polynom $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 2x - 10$ mit Hilfe des vollständigen Hornerchemas an der Stelle $x = 2$ in ein Taylorpolynom, und geben Sie sämtliche Ableitungswerte von f an der Stelle $x = 2$ an.

Aufgabe 2.3 (5 Punkte)

Bestimmen Sie unter Verwendung des Hornerchemas alle Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Gleichung

$$f(x) := x^5 - 4x^4 - 6x^3 + 26x^2 + 13x - 30 = 0.$$

(Hinweis: Bestimmen Sie zuerst alle ganzzahligen Lösungen.)

Aufgabe 2.4 (6 Punkte)

Von der Funktion $f(x)$ seien die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte an den Stützstellen $x_0, x_1, \dots, x_4$ bekannt:

i	0	1	2	3	4
x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	15	-1	1	15	83

Berechnen Sie das zugehörige Interpolationspolynom $p(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_4x^4$ vom maximalen Grad 4

- (a) nach der Lagrange-Darstellung $p(x) = \sum_{i=0}^4 f(x_i)L_i(x)$ mit den Lagrange-Polynomen $L_0, \dots, L_4$
- (b) nach der Methode von Newton.

Aufgabe 2.5 (6 Punkte)

Die Funktion $f(x) = \ln(x)$ sei im Intervall $[10, 12]$ durch ein quadratisches Polynom $p(x) = ax^2 + bx + c$ mit drei äquidistanten Stützstellen $x_0 = 10$, $x_1 = 11$ und $x_2 = 12$ interpoliert.

- (a) Zeigen Sie, dass der Interpolationsfehler an der Stelle $x = 11.1$ betragsmäßig kleiner als $\frac{1}{3}10^{-4}$ ist.

- (b) Bestimmen Sie das Vorzeichen der Fehlerfunktion $g(x) = f(x) - p(x)$ für beliebige $x \in [10, 12]$.

(Hinweis: Es wird nicht verlangt, das Interpolationspolynom explizit auszurechnen!)

Aufgabe 2.6 (15 Punkte)

Sind $x_0, \dots, x_n$, $n \in \mathbb{N}$ paarweise verschiedene Stützstellen mit vorgeschriebenen Funktionswerten $f_0, \dots, f_n$, dann hat die Lagrange-Darstellung des Interpolationspolynoms p die Form

$$p(x) = \sum_{j=0}^n f_j L_j(x),$$

wobei L_j die Lagrange-Polynome sind.

- (a) Wie hoch ist der Rechenaufwand zur Auswertung eines Interpolationspolynoms in der Lagrange-Darstellung, wenn das Interpolationspolynom an einer Stelle x naiv ausgewertet wird, d.h. die Produktsumme in oben angegebener Form gebildet wird? Zählen Sie nur die Punktoperationen.
- (b) Zeigen Sie, dass das Interpolationspolynom p die baryzentrische Darstellung

$$p(x) = \frac{\sum_{j=0}^n \frac{b_j}{x - x_j} f_j}{\sum_{j=0}^n \frac{b_j}{x - x_j}} \quad \text{mit den baryzentrischen Gewichten} \quad b_j := \left(\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n (x_j - x_i) \right)^{-1}$$

besitzt, indem Sie benutzen, dass die Lagrange-Funktionen eine Zerlegung der Eins bilden.

- (c) Wieviele Punktoperationen sind erforderlich, um $p(x)$ in der baryzentrischen Darstellung auszuwerten?
- (d) Wie hoch ist der Aufwand, wenn das Polynom wiederholt an verschiedenen Stellen ausgewertet wird, und bereits berechnete Werte zwischengespeichert werden dürfen?
- (e) Bestimmen Sie die baryzentrischen Gewichte $b_0, b_1, \dots, b_n$ im Falle $n = 4$ mit den äquidistanten Stützstellen $x_i = i$ für $i = 0, 1, 2, 3, 4$.
- (f) Vergleichen Sie die Ergebnisse aus (c) und (d) mit der Interpolationsmethode nach Newton.