

Mathematik IT 2 (Lineare Algebra)

für die Studiengänge Informatik, IMT und eBusiness im Sommersemester 2013

Geben Sie Ihren Namen, Matr.-Nr., Übungsgruppe auf Ihrer Lösung an und heften Sie alle Blätter zusammen!

Übungsblatt 5 - Abgabe bis Dienstag, 21.05.2013, 12:00 Uhr im Postfach 32 im HG

Aufgabe 5.1 (6 Punkte)

Gegeben sei die Menge V der Vornamen

$$V := \{\text{Ida}, \text{Ina}, \text{Ines}, \text{Inge}, \text{Irma}, \text{Irmgard}, \text{Jan}, \text{Jana}, \text{Janek}, \text{Jannes}\}$$

die der Reihe nach in eine Liste mit den Einträgen $\{0, 1, \dots, 52\}$ eingeordnet werden sollen. Würden die Schlüssel gemäß Aufgabe 4.1 verwendet, so kommt es von vornherein zu Kollisionen, die aufwändig aufgelöst werden müssen.

Leiten Sie ein einfaches Konzept für die Schlüsselmenge S her, sodass der Schlüssel eines Namens Groß- und Kleinschreibung sowie die alphabetische Reihenfolge der Buchstaben eines Namens berücksichtigt (der Buchstabe β soll dabei berücksichtigt werden; Umlaute werden wie folgt interpretiert: $\ddot{A}$ als Ae, $\ddot{a}$ als ae, $\ddot{o}$ als oe usw.; alle nicht im Alphabet vorkommenden Buchstaben und Sonderzeichen können ignoriert werden) und die Gefahr von Kollisionen bzgl. der Hashfunktion h aus Aufgabe 4.1.(1) reduziert wird. Bestimmen Sie mit diesem Schlüssel-system die Hashwerte der obigen Vornamen zur Einsortierung in die o.g. Liste, wobei zur Auflösung möglicher Kollisionen die Hashfunktion H aus Aufgabe 4.1.(2) verwendet werden soll. Dabei sei angenommen, dass die Hashtabelle noch leer ist, d.h. es wurden noch keine anderen Einträge vorgenommen. (Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Methoden, die den bisher in der Vorlesung behandelten Themen entsprechen!)

Aufgabe 5.2 (7 Punkte)

Die Funktionen $f_1, f_2, f_3, f_4 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ seien definiert durch

$$f_1(x) := x, \quad f_2(x) := -x, \quad f_3(x) := f_3(x) := \frac{1}{x} \quad \text{und} \quad f_4(x) := -\frac{1}{x}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass durch $(f_i \circ f_j)(x) := f_i(f_j(x))$ eine Gruppe $G_1 = (\{f_1, f_2, f_3, f_4\}, \circ)$ definiert ist. Stellen Sie die zugehörige Gruppentafel auf und geben Sie das neutrale Element der Gruppe an.
- (b) Weisen Sie nach, dass die Gruppen G_1 und $G_2 = (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$ nicht isomorph sind, indem Sie zeigen, dass in G_1 jedes Element zu sich selbst invers ist, d.h. $f_i \circ f_i$ ist für $i = 1, 2, 3, 4$ das neutrale Element, während diese Eigenschaft in G_2 nicht erfüllt ist.

(Hinweis zu (a): Auf den Nachweis der Assoziativität kann verzichtet werden, da für drei Funktionen f_i, f_j, f_k stets gilt $((f_i \circ f_j) \circ f_k) = f_i(f_j(f_k(x))) = (f_i \circ (f_j \circ f_k))(x)$.)

Aufgabe 5.3 (3 Punkte)

Eine nichtleere Teilmenge $U \subset G$ einer Gruppe $(G, \circ)$ heißt Untergruppe von G , wenn für alle $a, b \in U$ stets $a \circ b \in U$ und $a^{-1} \in U$ gilt. Beweisen Sie das sogenannte Untergruppenkriterium: U ist genau dann Untergruppe von $(G, \circ)$, wenn für alle $a, b \in U$ gilt $a \circ b^{-1} \in U$.

(Aufgaben 5.4 und 5.5 - siehe Seite 2)

Aufgabe 5.4 (9 Punkte)

Beweisen oder widerlegen Sie folgende Behauptungen:

- (a) $U := \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ist Untergruppe von $(\mathbb{Z}, +)$
- (b) $U := \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ist Untergruppe von $(\mathbb{Z}, +)$
- (c) Es seien U_1 und U_2 Untergruppen von $(G, \circ)$ bzgl. einer beliebigen Verknüpfung $\circ : G \times G \rightarrow G$. Dann ist $U_1 \cap U_2$ ebenfalls Untergruppe von G .
- (d) Es seien U_1 und U_2 beliebige Untergruppen von $(G, \circ)$ bzgl. einer beliebigen Verknüpfung $\circ : G \times G \rightarrow G$. Dann ist $U_1 \cup U_2$ ebenfalls Untergruppe von G .
- (e) Es seien U_1 und U_2 Untergruppen von $(G, \circ)$ bzgl. einer beliebigen Verknüpfung $\circ : G \times G \rightarrow G$. Außerdem gelte $U_1 \subset U_2$ oder $U_2 \subset U_1$. Dann ist $U_1 \cup U_2$ ebenfalls Untergruppe von G .

Aufgabe 5.5 (8 Punkte)

- (a) Schreiben Sie die Elemente der Permutationsgruppe S_3 in Zykelschreibweise auf. Geben Sie die Verknüpfungstafel für S_3 an (in Zykelschreibweise). Bestimmen Sie das inverse Element der Permutation $(123) \in S_3$, und lösen Sie die Gleichung $(23) \circ \pi = (12)$ mit $\pi \in S_3$. Ist die Gruppe S_3 zyklisch?
- (b) Falls Sie feststellen, dass die Gruppe S_3 zyklisch ist, dann geben Sie ein Beispiel für eine azyklische Gruppe an. Geben Sie andernfalls ein Beispiel für eine zyklische Gruppe an. (*Hinweis: Die in der Übung behandelten Beispiele (vgl. Aufgabe Ü5.4) werden dabei nicht akzeptiert, ebenso wenig die in der Vorlesung behandelten Beispiele bzgl. der Permutationsgruppen S_n !*)

Hinweis/Vereinbarung: Bei der Verknüpfung $x \circ y$ soll zuerst y und dann x ausgeführt werden. Stellen Sie die Verknüpfungstafel aus (a) so auf, dass für die Verknüpfung $x \circ y$ die Permutation x in der Zeile bzw. y in der Spalte der Tafel steht, d.h.

$\circ$	...	y	...
$\vdots$		$\vdots$	
x	...	$x \circ y$	...
$\vdots$			