

# Simplex-Verfahren Phase II

$$(P) \quad \begin{array}{l|l} \min & c^T x = z(x) \\ \text{bzgl.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} c \in \mathbb{R}^n, \quad x \in \mathbb{R}^n \\ A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad b \in \mathbb{R}^m \end{array}$$

- Ziel: Lösung von (P)  $\Leftrightarrow$  Bestimmung optimaler Ecken des zulässigen Bereichs  $G$  von (P)  $\Leftrightarrow$  Funktionswertverbesserung durch „systematisches Ablaufen“ der Ecken von  $G$

- Voraussetzungen

1.  $A$  hat vollen Zeilenrang, d.h.  $\text{rank}(A) = m \leq n$ .
2. Alle Ecken von  $G$  sind regulär.
3. Eine Ecke  $x^0$  mit der Basisdarstellung  $x_B^0 = p > 0, x_N^0 = 0$  ist bekannt.

- Simplex-Tableau: Aus zulässiger kanonischer Form von (P)

$$\min \quad z = z_0 + h^T x_N \quad \text{bzgl.} \quad x_B + D x_N = p$$

ergibt sich die Tableau-Darstellung

|       |         |         |        |
|-------|---------|---------|--------|
|       | $x_B^T$ | $x_N^T$ |        |
| $x_B$ | $E$     | $D$     | $p$    |
| $-z$  | $0^T$   | $h^T$   | $-z_0$ |

- Funktionswertanalyse

- (1) Es gilt  $h_k \geq 0$  für  $k = 1, \dots, n - m \Rightarrow$  Das Tableau ist optimal, der Punkt  $(x_B, x_N) = (p, 0)$  ist zulässige Basislösung und optimal.
- (2) Es gibt ein  $k \in \{1, \dots, n - m\}$  mit  $h_k < 0$  und  $d_{ik} \leq 0$  für  $i = 1, \dots, m \Rightarrow$  Das Optimierungsproblem besitzt keine Lösung, da der zulässige Bereich unbeschränkt ist bzw. die Zielfunktion in Richtung wachsender  $x_i$ -Werte unbeschränkt ist.
- (3) Für alle  $k$  mit  $h_k < 0$  gibt es mindestens ein  $i$  mit  $d_{ik} > 0 \Rightarrow$  Das Tableau ist nicht entscheidbar, man kann von einer Ecke  $x$  zu einer Ecke  $x^*$  übergehen mit  $z(x^*) \leq z(x)$ .

- Simplex-Austauschschritt [im Fall (3)]:

1. Ermittle Spaltenindex  $k$ , so dass  $h_k < 0$  minimal und im Fall der Mehrdeutigkeit  $k$  kleinstmöglich.
2. Ermittle Zeilenindex  $l$  mit

$$\frac{p_l}{d_{lk}} = \min \left\{ \frac{p_i}{d_{ik}} \mid d_{ik} > 0, \ i \in \{1, \dots, m\} \right\}$$

(falls mehrdeutig, dann wähle den kleinsten Index  $l$ ).

$$\Rightarrow x_{N,k} = \frac{p_l}{d_{lk}} \quad \Rightarrow \quad x_{B,l} = p_l - d_{lk} \cdot \frac{p_l}{d_{lk}} = 0$$

3. Austauschschritt:  $x_k$  wird Basisvariable,  $x_l$  wird Nichtbasisvariable  
Durchführung: Gauß-Jordan-Verfahren mit  $d_{lk}$  als Pivotelement

- wichtige Aussagen (vgl. Vorlesung):

- Erreicht der Simplex-Algorithmus eine reguläre Ecke, in der keiner der entscheidbaren Fälle (1) oder (2) vorliegt, so verkleinert sich der Funktionswert von  $z$  im folgenden Austauschschritt.
- Gilt  $\text{rank}(A) = m$  und sind alle Ecken des zulässigen Bereichs regulär, so endet der Simplex-Algorithmus nach endlich vielen Schritten. Besitzt das Problem Lösung(en), so wird eine der optimalen Ecken erreicht.

- Umgang mit ausgearteten Ecken:

$$x = (x_B, x_N) \quad \text{mit} \quad x_N = 0 \quad \text{und} \quad \exists i \in I_B : x_{B,i} = p_i = 0$$

Austauschschritt kann wie oben durchgeführt werden, hierbei kann

$$\frac{p_l}{d_{lk}} = 0$$

auftreten. In diesem Fall erfolgt ein „Null-Austausch“, d.h. Punkt und Zielfunktionswert bleiben unverändert; die Basisdarstellung der ausgearteten Ecke ändert sich und ermöglicht ggf. anschließend Verkleinerung von  $z$ .

ACHTUNG! Es besteht die Gefahr zyklischer Vertauschungen!

Maßnahmen gegen Zyklen:

1. Wähle stets die Pivotspalte so, dass  $h_k < 0$  minimal und  $k$  kleinstmöglich.
2. Stehen mehrere Pivotzeilen zur Auswahl, dann wähle die zum kleinsten Index  $l$ .