

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik/Diplom, Informatik/Bachelor, Informations- und Medientechnik/Bachelor
und eBusiness/ Bachelor, 3. Semester im Wintersemester 2011/2012

Übungsblatt 2 - Abgabe bis Dienstag, 01.11.2011, 12:00 Uhr im Postfach 32 im HG

Aufgabe 1 (6 Punkte)

A und B seien beschränkte und nichtleere Teilmengen der reellen Zahlen mit $A \subset B$. Zeigen Sie, dass $\inf(B) \leq \inf(A) \leq \sup(A) \leq \sup(B)$ gilt, und geben Sie zwei Beispiele für Mengen A und B an, bei denen in den behaupteten Ungleichungen an genau einer Stelle die Gleichheit gilt.

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Sei $a \in \mathbb{R}$ beliebig gewählt. Betrachten Sie die auf ganz $\mathbb{R}$ definierten Rundungsfunktionen

- $\lfloor x \rfloor := \max \{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\}$ (Gauß-Klammer bzw. floor-Funktion) und
- $\lceil x \rceil := \min \{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq x\}$ (ceil-Funktion).

Welche der folgenden Beziehungen sind richtig, welche sind falsch? Begründen Sie Ihre Antwort durch Beweis oder ein Gegenbeispiel.

- (a) $\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- (b) $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1$ für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$
- (c) $x < \lfloor a \rfloor + 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x \leq a$.
- (d) $x \leq \lfloor a \rfloor$ für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x < a$.
- (e) Aus $x \geq \lfloor a \rfloor$ folgt $x \geq a$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- (f) $\lfloor |x| \rfloor = \left| \lfloor x \rfloor \right|$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- (g) $\lfloor x \rfloor = -\lceil -x \rceil$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 3 (8 Punkte)

- (a) Skizzieren Sie die Menge $M := \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}((1-i)z) = 0\}$ in der komplexen Zahlenebene.
- (b) Stellen Sie die komplexen Zahlen $v = \frac{5+5i}{1+2i} - \frac{5-5i}{1-2i}$ und $w = \frac{8-2i}{4-i}$ in der Form $a + bi$ dar.
- (c) Bestimmen Sie alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C}$, für die die Gleichung $\frac{1}{2}z^6 = -3z^5 - \frac{13}{|\sqrt{3}+i|}z^4$ erfüllt ist und stellen Sie diese in der Form $z = a + bi$ dar. Hat die Lösungsmenge ein Infimum, Supremum, Minimum oder Maximum? Begründen Sie Ihre Antwort.

(Aufgaben 4 und 5 auf Seite 2)

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Untersuchen Sie die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit den angegebenen Gliedern auf Konvergenz bzw. Divergenz und bestimmen Sie im Fall der Konvergenz den Grenzwert:

(a) $a_n := \frac{3n^5 - 3n^3 + 1}{4n^5 + 4n^2 + n}$ für $n \geq 1$

(b) $a_n := n + 1 - \frac{(n-1)^2}{n+1}$ für $n \geq 0$

(c) $a_n := \sqrt{n + 6\sqrt{n}} - \sqrt{n + 4\sqrt{n}}$ für $n \geq 1$

(d) $a_n := \sqrt{3n^2 - 1} - \sqrt{4n^2 - \frac{1}{n}}$ für $n \geq 1$

Aufgabe 5 (4 Punkte)

Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zwei Folgen mit positiven Gliedern. Ferner gelte $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Beweisen Sie, dass unter den genannten Voraussetzungen gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 + b_n^2}{a_n + b_n} = 0$$