

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik/Diplom, Informatik/Bachelor, Informations- und Medientechnik/Bachelor
und eBusiness/Bachelor, 3. Semester im Wintersemester 2011/2012

Übungsblatt 12 - Abgabe bis Dienstag, 24.01.2012, 12:00 Uhr im Postfach 32 im HG

Aufgabe 1 (9 Punkte)

- (a) Gegeben sei die Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := -x \cdot \ln(x)$. Berechnen Sie die einzige Extremstelle von f . Diese werde an der Stelle $x_0 \in (0, \infty)$ angenommen. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die durch f , die x -Achse und die Gerade $x = x_0$ begrenzt wird.
- (b) Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := e^{2x} - 3e^x + 2$. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die zwischen den Nullstellen der Funktion f von f und der x -Achse eingeschlossen wird.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Untersuchen Sie, ob die folgenden uneigentlichen Integrale¹ existieren und bestimmen Sie deren Wert:

- (a) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$
- (b) $\int_1^\infty \frac{1}{x^c} dx$ für $c > 1$

Aufgabe 3 (7 Punkte)

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) := \frac{x}{1+x}$.

- (a) Entwickeln Sie die Funktionen f um den Entwicklungspunkt $x_0 = 2$ in eine Taylorreihe. Welchen Konvergenzradius hat die Taylorreihe von f ?
- (b) Berechnen Sie das Taylorpolynom 2. Grades zu f um den Entwicklungspunkt $x_0 = 2$ und schätzen Sie das Restglied für $x \in [1, 3]$ ab.

Aufgabe 4 (10 Punkte)

Berechnen Sie die Koeffizienten a_k und b_k der Fourierreihe $p(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ für die nachfolgend genannten 2π -periodischen Funktionen f :

- (a) $f(x) := \begin{cases} x & , \quad x \in [0, \pi] \\ \pi & , \quad x \in [\pi, 2\pi) \end{cases}$
- (b) $f(x) := |\sin(x)|$ für $x \in [-\pi, \pi)$

(Aufgabe 5 siehe Seite 2)

¹**Definition:** Sei $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die über jedem Intervall $[a + \varepsilon, b]$ für $0 < \varepsilon < b - a$ integrierbar ist. Falls der Grenzwert $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ existiert, dann setzen wir $\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$. Das Integral $\int_a^b f(x) dx$ heißt uneigentliches Integral. Analog definiert man $\int_a^\infty f(x) dx := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$ für $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, falls f auf jedem der Intervalle $[a, b]$ für $b > a$ integrierbar ist und der genannte Grenzwert existiert.

Aufgabe 5 (4 Punkte)

Welche der Funktionen

$$y_1(x) = \sin(x) \quad , \quad y_2(x) = \cos(x) \quad , \quad y_3(x) = e^{\sin(x)}$$

$$y_4(x) = 4 \left(1 - \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \right) \quad , \quad y_5(x) = -\frac{\ln(1-x)}{1+x}$$

löst die folgenden Differentialgleichungen?

$$(a) \quad y' = y \cos(x) \quad (c) \quad (y')^2 = 1 - y^2$$

$$(b) \quad y' = 4x - yx \quad (d) \quad y' = \frac{1}{1-x^2} - \frac{y}{1+x}$$