

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik/Diplom, Informatik/Bachelor, Informations- und Medientechnik/Bachelor
und eBusiness/Bachelor, 3. Semester im Wintersemester 2011/2012

Aufgaben für die Übungen am 12. und 13.01.2012

Aufgabe 1

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige und ungerade Funktion und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei eine stetige und gerade Funktion. Sei außerdem $a \in \mathbb{R}_{>0}$. Welche der folgenden Aussagen folgt aus den Eigenschaften von f und g ?

- ☐ (a) $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, $\int_{-a}^a g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) dx$, $\int_{-a}^a f(x) \cdot g(x) dx = 0$,
 $\int_{-a}^a f(x) \cdot f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) \cdot f(x) dx$ und $\int_{-a}^a g(x) \cdot g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) \cdot g(x) dx$
- ☐ (b) $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, $\int_{-a}^a g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) dx$, $\int_{-a}^a f(x) \cdot g(x) dx = 2 \int_0^a f(x) \cdot g(x) dx$,
 $\int_{-a}^a f(x) \cdot f(x) dx = 0$ und $\int_{-a}^a g(x) \cdot g(x) dx = 0$
- ☐ (c) $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, $\int_{-a}^a g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) dx$, $\int_{-a}^a f(x) \cdot g(x) dx = 2 \int_0^a f(x) \cdot g(x) dx$,
 $\int_{-a}^a f(x) \cdot f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) \cdot f(x) dx$ und $\int_{-a}^a g(x) \cdot g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) \cdot g(x) dx$

Aufgabe 2

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten bzw. bestimmten Integrale:

- (a) $\int \cos(2x + 3) dx$
- (b) $\int e^{\sqrt{x}} dx$
- (c) $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx$
- (d) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2(x) dx$
- (e) $\int \frac{x + 27}{x^2 - 9} dx$

Aufgabe 3

- (a) Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} x^2(x+1)^n$?
- (b) Bestimmen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 5^n (x-2)^n$.