

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik, IMT und eBusiness im Wintersemester 2012/2013

Geben Sie Ihren Namen, Matr.-Nr., Übungsgruppe auf Ihrer Lösung an und heften Sie alle Blätter zusammen!

Übungsblatt 1 - Abgabe bis Dienstag, 23.10.2012, 12:00 Uhr im Postfach 32 im HG

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Entscheiden Sie, welche der folgenden Abbildungen linear sind. Begründen Sie Ihre Antworten.

(a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) := \begin{pmatrix} x+y \\ y-x \end{pmatrix}$

(b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $f\left((1, 0, -1)^T\right) := (-1, 2, 3)^T$, $f\left((0, 1, 0)^T\right) := (3, 2, 0)^T$, $f\left((3, 2, -3)^T\right) := (3, 0, 1)^T$

(c) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $f(x) := \langle x, x \rangle \cdot x$.

(Hinweis: In (c) bezeichnet $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Standardskalarprodukt im $\mathbb{R}^n$.)

Aufgabe 2 (3 Punkte)

Bestimmen Sie mit dem euklidischen Algorithmus für Polynome den größten gemeinsamen Teiler von

$$f(x) := x^5 + 2x^2 - x + 2 \quad \text{und} \quad g(x) := x^4 + x^3 + 3x^2 + x + 2$$

Aufgabe 3 (5 Punkte)

Bestimmen Sie die Abbildungsmatrix sowie Basen von Kern und Bild der linearen Abbildung

$$f : \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 4} \quad \text{mit} \quad f(g) := g \cdot x + g(2) \cdot x^4$$

bezüglich der Standardbasen von $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ und $\mathbb{R}[x]_{\leq 4}$. Geben Sie außerdem die notwendigen Rechenschritte an, mit denen das Polynom $p(x) := 3x^3 + 2x^2 - 3x - 2$ durch die Abbildung f mit Hilfe der Abbildungsmatrix ausgewertet wird. (Hinweis: Dabei bezeichnet $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ den Vektorraum aller Polynome vom Höchstgrad $n = 3, 4$.)

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion die folgenden Behauptungen:

(a) Für $n \geq 1$ gilt $\sum_{k=1}^n (4k-1) = 2n^2 + n$

(b) Für $n \geq 2$ gilt $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{k-1}{k}\right) = \frac{1}{n!}$.

(c) $a_n := 5^{2n} - 3^{2n}$ ist durch 8 teilbar für $n \in \mathbb{N}$