

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik, IMT und eBusiness im Wintersemester 2012/2013

Geben Sie Ihren Namen, Matr.-Nr., Übungsgruppe auf Ihrer Lösung an und heften Sie alle Blätter zusammen!

Übungsblatt 5 - Abgabe bis Dienstag, 20.11.2012, 12:00 Uhr im Postfach 32 im HG

Aufgabe 16 (14 Punkte)

Nach Definition aus der Vorlesung heißt a Häufungspunkt einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, wenn es eine Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gibt, die gegen a konvergiert. In der Literatur wird auch der Begriff des Häufungswertes verwendet. Untersuchen Sie die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auf die Existenz von Häufungspunkten. Geben Sie falls möglich alle Häufungspunkte an.

$$(a) \quad a_n := \frac{(-1)^{n+1}8n^4 + 3}{5 - 3n^2 + 5n^4} + (-1)^n \cdot \frac{3n^2 + (-1)^n}{8n^2 - 9n + 1}$$

$$(b) \quad a_n := \left(5n - 25 \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor\right) \cdot \frac{3n^7 - 1}{(-1)^n - 8n^7}$$

$$(c) \quad a_n := \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \frac{(-1)^n n^2 - 2}{\sqrt{2}n^2 + n}$$

$$(d) \quad a_n := \frac{999n^9 - 8n^8 - 777n^7 - 999n^6 - n^5 - n^4 - 888n^3}{10^9n + 10^8n^2 + 10^7n^7 + 10^6n^8} \cdot \frac{n^9 + (-1)^n n^8}{99n^9 - (-1)^n n^8} + \frac{(-1)^n + 9}{n^2}$$

Aufgabe 17 (7 Punkte)

Beweisen Sie die Divergenz der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aus Hausaufgabe 11.(a).(i) auf verschiedenen Wegen:

- (a) mit Hilfe der $\varepsilon - n_0$ -Definiton der Konvergenz einer reellen Zahlenfolge
- (b) mit Hilfe des Cauchy-Kriteriums der Konvergenz einer reellen Zahlenfolge

(Hinweis: Alle „Rechenwege“ müssen begründet werden!)

Aufgabe 18 (9 Punkte)

- (a) Untersuchen Sie, ob die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $c_n := \frac{3n^4 + 3n^3 - n^6 - 9n + 3n^5i + 2n^4i + 6n^2i + 6ni}{n^6i - 9i}$ konvergiert. Geben Sie im Fall der Konvergenz den Grenzwert an.
- (b) Untersuchen Sie die komplexwertige Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $c_n := \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i\right)^n$ auf die Existenz von Häufungspunkten. Falls die Folge Häufungspunkte besitzt, dann geben Sie diese an.
- (c) Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{R}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{R}}$ reelle Zahlenfolgen. Zeigen Sie, dass eine Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ komplexer Zahlen mit $c_n := a_n + ib_n$ genau dann gegen $c = a + ib \in \mathbb{C}$ konvergiert, wenn die Folge der Realteile $(a_n)_{n \in \mathbb{R}}$ gegen a und die Folge der Imaginärteile $(b_n)_{n \in \mathbb{R}}$ gegen b konvergiert.