

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik, IMT und eBusiness im Wintersemester 2012/2013

Aufgaben für die Übungen am 01./02. November 2012

Aufgabe Ü8

- (a) Skizzieren Sie die Menge $M := \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}((1-i)z) = 0\}$ in der komplexen Zahlenebene.
- (b) Bestimmen Sie die Beträge der komplexen Zahlen $u := \frac{1}{1-i}$ und $v := \frac{i}{1+2i} + \frac{3}{4i}$.
- (c) Bestimmen Sie alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C}$, für die die Gleichung $z^2 = -25$ erfüllt ist.
- (d) Bestimmen Sie die Lösungsmenge $\mathcal{L} \subset \mathbb{C}$ der Ungleichung $|z-1|^2 \leq z \cdot \bar{z}$.

Aufgabe Ü9

Welche der folgenden Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sind arithmetische Folgen, geometrische Folgen und/oder alternierende Folgen? Untersuchen Sie die Folgen zudem auf Beschränktheit und diskutieren Sie die Monotonie.

- (a) $a_n := n + 3$ für $n \geq 0$
- (b) $a_n := \frac{(-1)^n}{2^n}$ für $n \geq 0$
- (c) $a_0 := 1, a_n := a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1}$ für $n \geq 1$
- (d) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \{2, 6, 18, 54, \dots\}$
- (e) $a_n := \frac{1}{n+1}$ für $n \geq 0$
- (f) $a_n := 2n + (-1)^n$ für $n \geq 0$

Aufgabe Ü10

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion.

- (a) Für jede arithmetische Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt für $n \geq 1$: $a_n = a_0 + nc$ mit $c = a_1 - a_0$.
- (b) Für jede geometrische Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt für $n \geq 1$: $a_n = a_0 c^n$ mit $c = \frac{a_1}{a_0}$.

Aufgabe Ü11

Sei $a \in \mathbb{R}$ beliebig gewählt. Betrachten Sie die auf ganz $\mathbb{R}$ definierten Rundungsfunktionen

- $\lfloor x \rfloor := \max \{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\}$ (Gauß-Klammer bzw. floor-Funktion) und
- $\lceil x \rceil := \min \{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq x\}$ (ceil-Funktion).

Welche der folgenden Beziehungen sind richtig, welche sind falsch? Begründen Sie Ihre Antwort durch Beweis oder ein Gegenbeispiel.

- (a) $\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

- (b) $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1$ für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$
- (c) $x < \lfloor a \rfloor + 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x \leq a$.
- (d) $x \leq \lfloor a \rfloor$ für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x < a$.
- (e) Aus $x \geq \lceil a \rceil$ folgt $x \geq a$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- (f) $\lfloor |x| \rfloor = \left| \lfloor x \rfloor \right|$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- (g) $\lfloor x \rfloor = -\lceil -x \rceil$ für alle $x \in \mathbb{R}$.