

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik, IMT und eBusiness im Wintersemester 2013/2014

Aufgaben für die Übungen vom 09. bis 11.10.2013

Aufgabe Ü1.1

Seien u, v und w drei linear unabhängige Vektoren aus $\mathbb{R}^3$. U, V bzw. W seien die linearen Hüllen dieser Vektoren, also $U = \text{span}\{u\}$, $V = \text{span}\{v\}$ und $W = \text{span}\{w\}$. Es gilt:

- ☐ (a) $\text{span}(U \cup V \cup W) = \mathbb{R}^3$
- ☐ (b) $\text{span}((U \cap V) \cup W) = \mathbb{R}^3$
- ☐ (c) $\text{span}(U \cup (V \cap W)) = \mathbb{R}^3$

Aufgabe Ü1.2

Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum über einem Körper ($n \in \mathbb{N}$) und $f : V \rightarrow V$ mit $f(x) = Ax$ sei eine lineare Abbildung, wobei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Die Abbildung f ist genau dann bijektiv, falls

- ☐ (a) der Zeilenraum von A die Dimension $n - 1$ hat.
- ☐ (b) A invertierbar ist.
- ☐ (c) $n > 1$ gilt und A symmetrisch ist.
- ☐ (d) keine der genannten Alternativen (a), (b) oder (c) zutrifft.

Aufgabe Ü1.3

Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung, und die Vektoren v_1, v_2 bilden eine Basis des Kerns $\ker(f)$. Für die Dimension des Bildes $\text{im}(f)$ gilt dann

- ☐ (a) $\dim(\text{im}(f)) = 2$
- ☐ (b) $\dim(\text{im}(f)) = 3$
- ☐ (c) $\dim(\text{im}(f)) = 4$

Aufgabe Ü1.4

- (a) Weisen Sie nach, dass $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.
- (b) Bestimmen Sie mit dem Euklidischen Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler der Zahlen 1800 und 1275.
- (c) Ermitteln Sie die multiplikative Inverse $[10]^{-1}$ zur Restklasse $[10]$ im Körper $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$.
- (d) Berechnen Sie den Wert von $(3 + 5^4) \cdot (3 - 5^4) + 3^5$ im Körper $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

- (e) Gegeben seien $f, g \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ mit $f(x) = 2x^9 + 2x^7 + 2x^6 + x^3 + x^2 + 2$ und $g(x) = x^3 + 2x + 2$. Bestimmen Sie Polynome $q, r \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[x]$ mit $f = q \cdot g + r$.
- (f) Ist die durch $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ mit $f((a, b, c, d)^T) := (a-b)x^3 + (b-c)x^2 + dx + a$ definierte Abbildung eine lineare Abbildung?
- (g) Ist das Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

lösbar? Wenn ja, dann bestimmen Sie die Lösungsmenge $\mathcal{L}(A, b)$ und geben Sie diese in der Form $\mathcal{L}(A, b) = x_p + \ker(A)$ an, wobei x_p eine beliebige, aber feste Lösung des gegebenen inhomogenen Gleichungssystems ist.

Aufgabe Ü1.5

- (a) Berechnen Sie die Determinante von $A := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$.
- (b) Berechnen Sie die Inverse B^{-1} von $B := \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.
- (c) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix $C := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

Aufgabe Ü1.6

Gegeben seien die folgenden Vektoren:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 8 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 11 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Es seien $U = \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$, $V = \text{span}\{v_1, v_2\}$ und $U + V = \text{span}(U \cup V)$.

- (a) Bestimmen Sie eine Basis von U ,
- (b) sowie eine Basis von $U + V$.
- (c) Ergänzen Sie die Basis von $U + V$ zu einer Basis von $\mathbb{R}^5$.
- (d) Geben Sie die Dimensionen von U , V , $U + V$ und $U \cap V$ an.
- (e) Für welche Werte $s, t \in \mathbb{R}$ liegt der Vektor $w = (4, -2, s, t - 29, 2t - s)^T$ in $U + V$?

Verwenden Sie in (a), (b), (c) und (e) ausschließlich den Gauß-Algorithmus!

(Hinweis: Zur Reduzierung des Rechenaufwandes führen Sie die Rechnungen von (b) und (c) parallel durch.)