

Mathematik IT 3 (Analysis)

für die Studiengänge Informatik, IMT und eBusiness im Wintersemester 2014/2015

Geben Sie Ihren Namen, Matr.-Nr., Übungsgruppe auf Ihrer Lösung an und heften Sie alle Blätter zusammen!

Übungsblatt 15 - Abgabe bis **Donnerstag, 05.02.2015, 11 Uhr** im Postfach 32 im HG

Die Korrektur Ihrer Lösungen erfolgt nur, wenn Sie noch nicht 50 % der Übungspunkte erreicht haben, die sich aus den Ergebnissen der Übungsblätter 1 bis 14 ergeben.

Aufgabe H15.1 (17 Punkte)

- (a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$e^y = \frac{x+1}{y'}$$

Geben Sie die Lösungskurven zu den Anfangswerten $y(1) = 1$ bzw. $y(-2) = 0$ an.

- (b) Lösen Sie die Anfangswertaufgabe $e^y = \frac{y'}{x+1}$ mit $y(1) = 0$.

- (c) Lösen Sie die Anfangswertaufgabe

$$y' \sqrt{y} - \frac{10x+7}{\sqrt{y}} = 0, \quad y > 0, \quad y(1) = 5$$

(Prüfungsaufgabe Mathematik IT-3, BTU Cottbus, Wintersemester 2013/14)

- (d) Lösen Sie die Anfangswertaufgabe $1 + y^2 - xy' = 0$ mit $y(1) = 1$.

Aufgabe H15.2 (12 Punkte)

- (a) Lösen Sie die Differentialgleichung

$$\frac{y'}{\sqrt{2 - \cos(x)}} = y \sin(x)$$

mit $y > 0$ und dem Anfangswert $y(0) = \exp\left(\frac{3}{2}\right)$. (Hinweis: Verwenden Sie nach der Trennung der Variablen auf einer Seite bei der Integration eine geeignete Substitution!)

(Prüfungsaufgabe Mathematik IT-3, BTU Cottbus, Wintersemester 2013/14)

- (b) Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$(x^2 - 2x - 8)yy' - (5x - 8)(y^2 + 1) = 0$$

mit $x \in [-1, 2)$, $y \geq 0$ und $y(-1) = 0$. (Hinweis: Führen Sie nach Trennung der Variablen auf einer Seite Partialbruchzerlegung zur Integration durch.)

Aufgabe H15.3 (5 Punkte)

- (a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $y' = \frac{4+y^2}{4+x^2}$.
- (b) Geben Sie zwei spezielle Lösungen von (a) mit $y(0) = 0$ bzw. $y(0) = 1$ an.

Hinweis: Benutzen Sie die Beziehung $\tan(a+b) = \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)}$ zur Vereinfachung der allgemeinen Lösung.

Aufgabe H15.4 (5 Punkte)

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $xy' - 2y = x^3 \cos(x)$.

Aufgabe H15.5 (6 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass $\prod_{k=0}^{n-1} (2k+1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.
- (b) Beweisen Sie, dass die Gleichung $\sum_{k=1}^n (4k-1) = 2n^2 + n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Aufgabe H15.6 (20 Punkte)

Bestimmen Sie Lösungsmenge $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{R}$ der folgenden (Un)gleichungen unter Berücksichtigung der angegebenen Nebenbedingung. Untersuchen Sie $\mathcal{L}$ über dem Körper $\mathbb{R}$ auf die Existenz von Infimum, Supremum, Minimum und Maximum, und geben Sie diese Zahlen im Fall ihrer Existenz an. Was ändert sich, wenn man die (Un)gleichungen über dem Körper $\mathbb{Q}$ betrachtet?

- (a) $\frac{13-3x^2}{\sqrt{11}x-1} > \sqrt{11}x+1$ unter der Nebenbedingung $x \geq -\sqrt{11}$ *Hinweis: Es gilt $\sqrt{11} \approx 3.3166$.*
- (b) $\sin^4(x) - \frac{1}{2}\sin(x) = \frac{1}{2}\sin^2(x) - \sin^3(x)$ unter der Nebenbedingung $x \in [-2\pi, 3\pi]$
Hinweis: Wählen Sie eine geeignete Substitution.
- (c) $\frac{x^2+4}{6x^2+11} \leq \frac{1}{x^2-4}$ ohne Nebenbedingungen

Aufgabe H15.7 (12 Punkte)

- (a) Stellen Sie die komplexen Zahlen $v = \frac{5+5i}{1+2i} - \frac{5-5i}{1-2i}$ und $w = \frac{8-2i}{4-i}$ in der Form $a+bi$ dar.
- (b) Bestimmen Sie Real- und Imaginärteil der komplexen Zahl

$$z = \left(\frac{3-2i}{2+3i}\right)^2 + \frac{(-1-i)^3}{\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)}$$

- (c) Bestimmen Sie alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C}$, für die die Gleichung $z^3 = -\frac{2}{i}z - \frac{5}{1+2i}z$ erfüllt ist und stellen Sie diese in der Form $z = a+bi$ dar:

Aufgabe H15.8 (7 Punkte)

(Prüfungsaufgabe Mathematik IT-3, BTU Cottbus, Wintersemester 2013/14)

- (a) Berechnen Sie den Grenzwert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n := \sum_{k=1}^n \frac{2^{k+2}}{5^k}$

- (b) Bestimmen Sie alle Häufungspunkte der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n := \frac{(-1)^n 3n^2 - 2n + (-1)^n}{5n^2 + (-1)^n n} + c_n$, wobei $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} c_{3k} = -\frac{3}{2}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} c_{3k+1} = \frac{1}{2}$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} c_{3k+2} = 2$ ist.

Aufgabe H15.9 (8 Punkte)

(Prüfungsaufgabe Mathematik IT-3, BTU Cottbus, Wintersemester 2013/14)

Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz und absolute Konvergenz:

(a) $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(-3)^n + (-1)^{n+1}}{4^n + 8}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{(3 + (-1)^n)^n}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \sqrt{n}}{(n+2)!}$

Aufgabe H15.10 (4 Punkte)

Sind für die unendliche Reihe

$$R := 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5^3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5^4} + \dots$$

die Voraussetzungen des Konvergenzkriteriums von Leibniz erfüllt?

Aufgabe H15.11 (5 Punkte)

Weisen Sie nach, dass die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k}}$$

konvergiert, indem Sie die Beschränktheit der zugehörigen Partialsummenfolge nachweisen. Zeigen Sie dazu zuerst mit vollständiger Induktion, dass die Ungleichung

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k\sqrt{k}} < 3 - \frac{2}{\sqrt{n}}$$

für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ gilt.

Aufgabe H15.12 (10 Punkte)

Führen Sie für die Funktion

$$f(x) = |x^2 - 1| + |x| - 1$$

eine Kurvendiskussion mit folgenden Inhalten durch: Definitions- und Wertebereich, Nullstellen, Verhalten im Unendlichen, Monotonieverhalten, Koordinaten der lokalen Extrem- und Wendepunkte.

Aufgabe H15.13 (17 Punkte)

(Prüfungsaufgabe Mathematik IT-3, BTU Cottbus, Wintersemester 2013/14)

- (a) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{4} \sin(-\pi x) - \frac{1}{2}x & , \quad x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1 - \sqrt{2x}}{\exp(2x - 1) - 1} & , \quad x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Untersuchen Sie, ob die Funktion in $x_0 = \frac{1}{2}$ stetig ist.

- (b) Untersuchen Sie, ob die stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} 3x^2 + 1 & , \quad x \leq 0 \\ \left(2 - (\cos(\pi x))^2\right)^2 & , \quad x > 0 \end{cases}$$

in $x_0 = 0$ differenzierbar ist.

- (c) Bestimmen Sie die Lage und die Art der lokalen Extremwerte von $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \left(x^2 - 3x - \frac{3}{2}\right) \cdot \exp(2x) .$$

- (d) Entwickeln Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = e^x \cdot x$ um den Entwicklungspunkt $x_0 = 1$ in eine Taylorreihe. Welchen Konvergenzradius hat die Taylorreihe von f ?

Aufgabe H15.14 (13 Punkte)

(Prüfungsaufgabe Mathematik IT-3, BTU Cottbus, Wintersemester 2013/14)

- (a) Gegeben sei die Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{3}{2}x\right) \cos(8x) + 1}{\ln\left(e \cdot \frac{x^2}{\pi^2}\right) - 1} & , \quad x \in (0, \pi) \\ \cos(x) + 1 & , \quad x \in [\pi, 2\pi] \\ x^2 - 4x\pi + 4\pi^2 & , \quad x \in (2\pi, \infty) \end{cases}$$

Untersuchen Sie, ob die Funktion in den Stellen $x_1 = \pi$ bzw. $x_2 = 2\pi$ stetig ist.

- (b) Weisen Sie mit Hilfe des Differentialquotienten nach, dass die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} 3x - 1 & , \quad x < 1 \\ 2x^2 - x + 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

in $x_0 = 1$ differenzierbar ist, und geben Sie $f'(x_0)$ an. (*Hinweis: Zeigen Sie mit Hilfe des Differentialquotienten, dass f in x_0 linksseitig und rechtsseitig differenzierbar ist.*)

- (c) Berechnen Sie das Taylorpolynom 3. Grades der Funktion $f(x) = \frac{\sin(2x)}{e^x}$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ und schätzen Sie das Restglied für $x \in [0, \frac{1}{10}]$ nach oben ab.